

Valeurs de référence de l'IGF BP3 (mg/l)				
Age (années)	Masculin		Féminin	
0	1,11	3,18	1,05	3,27
1	1,29	3,63	1,22	3,72
2	1,46	4,07	1,39	4,15
3	1,64	4,49	1,55	4,56
4	1,80	4,88	1,71	4,93
5	1,94	5,19	1,85	5,24
6	2,04	5,38	1,94	5,40
7	2,10	5,47	2,02	5,51
8	2,15	5,55	2,10	5,63
9	2,22	5,66	2,18	5,76
10	2,30	5,80	2,27	5,91
11	2,38	5,96	2,36	6,05
12	2,46	6,09	2,44	6,18
13	2,53	6,20	2,52	6,29
14	2,58	6,27	2,58	6,36
15	2,61	6,31	2,64	6,43
16	2,64	6,32	2,68	6,47
17	2,66	6,32	2,72	6,49
18	2,68	6,33	2,75	6,51
19	2,70	6,34	2,78	6,53
20	2,72	6,36	2,81	6,55
21–25	2,75	6,36	2,85	6,56
26–30	2,68	6,13	2,75	6,22
31–35	2,61	5,98	2,57	5,80
36–40	2,57	5,98	2,50	5,71
41–45	2,51	6,02	2,41	5,61
46–50	2,37	5,89	2,34	5,61
51–55	2,25	5,81	2,31	5,70
56–60	2,13	5,71	2,24	5,72
61–65	2,03	5,61	2,16	5,69
66–70	1,93	5,49	2,06	5,57
71–75	1,78	5,20	2,00	5,55
76–80	1,67	5,01	1,95	5,49
81–85	1,63	5,01	1,92	5,50
86–90	1,66	5,24	1,96	5,67